



Heptacodium miconioides

Zevenzonenboom

Deze bladverliezende heester heeft een fijne trosvormige bloei in het najaar op een moment dat er weinig planten zijn die bloeien. Hij heeft een luchtige bloeitros met witte bloemetjes die een goede geur afscheiden. De rode kelkbladeren verkleuren naar rood en deze zijn samen aanwezig met de bloei. Dit zorgt voor een langdurig en mooi kleurenspektakel.'

Het blad heeft een langwerpige vorm en een glanzend groene kleur. In de herfst valt het blad af. De takken hebben een lichtbruine kleur en schilferen af. De bloei vindt plaats in van augustus tot oktober, de rode kelkblaadjes zijn al zichtbaar wanneer de witte geurende stervormige bloemetjes nog steeds aanwezig zijn.

Het is aangeraden om de plant te snoeien net na de vorst. Dit zorgt ervoor dat de plant meer vertakt en een bossigere groei zal krijgen. Hij bloeit ook meer op eenjarig hout wat dus ook de bloei verbetert.

Hij staat graag op een zonnige tot halfbeschaduwde standplaats en dit op een doorlatende bodem, hij kan zowel op een zure als kalkrijke bodem groeien. De verkleuring van de bloemen en de uitbundigheid van de bloei is spectaculairder wanneer hij op een zonnige standplaats staat.





Kenmerken

Bloemkleur	Geelgroen
Bloeiperiode	augustus - oktober
Bladkleur lente	Groen
Bladkleur zomer	Groen
Bladkleur herfst	Geel
Winterbeeld	Bladverliezend
Schorskleur	Bruin
Groeikracht	Matig
Hoogte volgroeide plant	3.00 tot 4.00 m
Standplaats	Zon - Halfschaduw - Bestand tegen zeewind
Aantal per vierkante meter	< 1
Snoeiperiode	Na de winter
Te gebruiken potgrond	Bodemverbeteraar universeel
Aanbevolen plantvoeding	Organische meststof voor sierheesters
Gebruikswaarde	Alleenstaand - Bijenlokker - Borderbeplanting - Vlinderlokker
Synoniemen	Heptacodium jasminoides Airy Shaw



Fotogalerij

