



Metasequoia glyptostroboides

Watercipres

Deze plant is één van de weinige coniferen die zijn naalden verliest. Hij heeft een frisgroene kleur en verkleurt in de herfst naar bronsbruin tot oranjebruin. Als jonge boom heeft hij een smalle kegelvormige kroon die bij het ouder worden breed kegelvormig wordt. Aan de kaarsrechte hoofdstam staan regelmatig vertakkingen. Tot 1941 was hij enkel bekend als fossiel.'

Jonge twijgen zijn iets schuin omhoog gericht, oudere takken staan vrijwel horizontaal. Hij groeit tot circa 10 meter breed. De stam van oude bomen wordt knoestig en schilfert in smalle platen af. Jonge twijgen zijn roodbruin en de naalden staan op kort- en langloten en zijn tegenoverstaand, dit in tegenstelling tot Taxodium, hierbij staan de naalden verspreid. In de herfst bronsbruin tot oranjebruin verkleurend en samen met de kortloten afvallend. Metasequoia was tot 1941 slechts als fossiel bekend en werd herontdekt door een Chinese houtvester in het zuidwesten van China. Vanaf dat moment is hij weer over de wereld verspreid. Lijkt oppervlakkig op Taxodium maar de groeiwijze is meer open en de zijtakken hebben een gevederde groei.

Hij draagt eivormige tot kogelronde kegels in het najaar die 2 tot 2,5cm groot zijn. Deze bladverliezende conifeer heeft graag een vochthoudende goed doorlaatbare bodem. De boom mag opgesnoeid worden in het vroege voorjaar.





Kenmerken

Bloemkleur	Violetblauw
Bloeiperiode	mei
Bladkleur lente	Licht groen
Bladkleur zomer	Licht groen
Bladkleur herfst	Geel
Winterbeeld	Bladverliezend
Schorskleur	Bruin
Groeivorm	Breed kegelvormig - Kegelvormig
Groeikracht	Snel
Hoogte volgroeide plant	25.00 tot 35.00 m
Oogst periode	September
Standplaats	Zon - Halfschaduw
Aantal per vierkante meter	< 1
Onderhoudszorg	Steunpaal voorzien
Snoeiperiode	Na de winter
Te gebruiken potgrond	Bodemverbeteraar universeel
Aanbevolen plantvoeding	Organische meststof voor coniferen
Gebruikswaarde	Alleenstaand - Bos



Fotogalerij

