



Rubus idaeus 'Glen Ample'

Framboos

Deze grote stevige lichtrode zomerframboos die al in juli rijp is. Hij heeft een goede productiviteit en heeft ook een groot voordeel omdat hij geen stekels heeft op de takken. Dit maakt het plukken en snoeien wat aangenamer.'

De framboos is een in heel Europa van nature voorkomende plant, die op open plaatsen in het bos en langs bosranden voorkomt en is als voedsel al sinds de vroegste tijden in gebruik. De teelt gaat terug tot de Middeleeuwen.

Hij heeft graag een doorlaatbare humusrijke bodem maar vergt in de zomer toch vrij veel vocht. Natte voeten zorgen ervoor dat de stengels zullen rotten. Liefst heeft hij ook een zonnige ietwat beschutte standplaats .

De plant is een heester waarvan de stengels tot 1.8 meter lang kunnen worden. Elk jaar worden nieuwe stengels uit wortelopslag gevormd. Bij de zomerframboos dragen alleen de tweejarige stengels vrucht, waarna deze afsterven. Bij de herfstframboos dragen daarentegen de toppen van de eenjarige scheuten de vruchten. De framboos bestaat uit vele vruchtjes en is een verzamelsteenvrucht. In tegenstelling tot de braam laat de framboos makkelijk los van de bloembodem.

Door verschillende teeltmethoden toe te passen kan de oogst over een lange periode, van eind april tot eind december, gespreid worden.

Zomerframbozen. Door de zomerframbozen in een plastic tunnel te telen is de oogst met ongeveer een maand te vervroegen. Frambozen kunnen ook onder glas geteeld worden, zowel in potten als in de grond. Door de kas te verwarmen kan de oogst nog eens met een maand vervroegd worden.

Normale buitenteelt. Direct na de oogst worden de afgedragen stengels verwijderd. In het vroege voorjaar worden de nieuwe stengels aangebonden. Voor de buitenteelt worden 8-10 stengels per meter aangehouden, de rest van de stengels wordt weggesnoeid.

Herfstframbozen. Om een goede oogst in het najaar te krijgen worden in de winter alle scheuten weggesnoeid. Door herfstframbozen in een verwarmde kas te telen kan de oogst tot eind december plaatsvinden. Bij de doorteelt worden in de winter alleen de afgedragen toppen verwijderd. In het voorjaar wordt dan van de onderste ogen geoogst.





Kenmerken

Bloemkleur	Wit en geel
Bloeiperiode	juni
Bladkleur lente	Groen
Bladkleur zomer	Groen
Bladkleur herfst	Groen
Winterbeeld	Bladverliezend
Schorskleur	Grijs
Groeivorm	Opgaand - Vaasvormig
Groeikracht	Snel
Hoogte volgroeide plant	1.50 tot 1.80 m
Vruchtsoort	Bes
Vruchtkleur	Rood
Vrucht toepassingen	Confituur - Decoratie vr bord - Dessert - Fruitsap - Hand - Taart
Oogst periode	Juli
Bestuivingsperiode	Zelfbestuivend
Standplaats	Zon - Halfschaduw
Aantal per lopende meter	1
Onderhoudszorg	Steunpaal voorzien
Te gebruiken potgrond	Potgrond universeel
Aanbevolen plantvoeding	Organische meststof voor groenten & fruit
Gebruikswaarde	Alleenstaand - Hagen/Blokhagen - Leivorm - Kruiden & keuken



Fotogalerij

