



Cotoneaster horizontalis

Dwergmispel

De takken van deze bladverliezende heester groeien visgraatvormig. Het kleine groene blaadje verkleurt rood in de herfst. In het voorjaar heeft hij een kleine witte bloei waarna er rode bessen ontstaan die tot in de winter aan de plant blijven hangen en geliefd zijn bij de vogels. Het is een hogere soort die voor een hogere bodembedekking zorgt dan de cotoneaster dammeri.'

Deze plant kan goed gebruikt worden als bodembedekking of als lage muurbegroeiing. Hij verdraagt vormsnoei en heeft een klein ovaal puntig blaadje die in de herfst rood verkleurt en afvalt. In het voorjaar verschijnt er een klein wit tot roze bloemetje. Na de bladval is er nogaltijd de aanwezigheid van de felrode bessen. De planten kunnen na lange tijd tot 1 meter groeien maar kan door snoei gemakkelijk klein gehouden worden.





Kenmerken

Bloemkleur	Witroze
Bloeiperiode	mei
Bladkleur lente	Groen
Bladkleur zomer	Groen
Bladkleur herfst	Rood
Winterbeeld	Bladverliezend
Schorskleur	Bruin
Groeivorm	Open
Groeikracht	Matig
Hoogte volgroeide plant	0.90 tot 1.10 m
Vruchtkleur	Rood
Standplaats	Zon - Halfschaduw
Aantal per vierkante meter	5
Snoeiperiode	In de zomer
Te gebruiken potgrond	Bodemverbeteraar universeel
Aanbevolen plantvoeding	Organische meststof voor sierheesters
Gebruikswaarde	Alleenstaand - Bodembedekkend - Borderbeplanting - Vakbeplanting - Vogellokker



Fotogalerij

