



Clematis 'Lasurstern'

Bosrank

Deze vroegbloeiende clematis bloeit al in mei, juni met grote bloemen, in augustus, september is er vaak nog een tweede bloei die iets kleiner is. De bloemen hebben een mooie lavendelblauwe kleur met een geel hart. Geef de plant een zonnige tot halfbeschaduw plaatsje maar zorg dat de voet beschermt is.'

Plant de Clematis op een goed doorlatende alkalische tot neutrale standplaats. Het loof mag in de volle zon tot half schaduw maar de voet heeft liever een koele beschutte standplaats, dit kan bijvoorbeeld daar een plant bij de voet te planten zodat die de nodige beschutting krijgt.

Deze clematis wordt best niet teveel gesnoeid omdat dit de bloei zal beïnvloeden. U kunt in februari/maart de dode takken wegsnoeien. Indien gewenst kunt u ook enkele oudere takken wegsnoeien, een andere mogelijkheid is om te snoeien na de bloei.

Clematis is gevoelig voor takbreuk dus steeds opgepast wanneer u de plant snoeit en er takken uittrekt. Ook verwelkingsziekte kan voorkomen, indien u uw plant dieper plant bij het aanplanten zorgt u ervoor dat de ondergrondse plantdelen gezond blijven en opnieuw terug uitlopen terwijl er bovengronds takken kunnen afsterven. Verwelkingsziekte is ook te behandelen met sporgon.





Kenmerken

Bloemkleur	Lavendelblauw
Bloeiperiode	mei - juni - september
Bladkleur lente	Groen
Bladkleur zomer	Groen
Bladkleur herfst	Groen
Winterbeeld	Bladverliezend
Schorskleur	Bruin
Groeivorm	Leivorm - Rankend/slingerend - Zelfhechtend
Groeikracht	Matig
Hoogte volgroeide plant	2.00 tot 3.00 m
Standplaats	Zon - Halfschaduw
Aantal per lopende meter	1 - 2
Onderhoudszorg	Steunpaal voorzien
Snoeiperiode	Na de winter
Te gebruiken potgrond	Potgrond universeel
Aanbevolen plantvoeding	Organische meststof voor klimplanten
Gebruikswaarde	Leivorm



Fotogalerij

